



Region Örebro län

Universitetssjukhuset Örebro

Information till dig som ska få en subkutan venport



Patientinformation

Kärl-Thoraxkliniken

Välkommen till oss på Universitetssjukhuset i Örebro och Kärll-thoraxkliniken.

Denna broschyr innehåller information till dig som operativt skall erhålla en subkutan venport (subcutan= under huden).

Bakgrund


En subkutan venport får du insatt när du behöver få upprepade behandlingar direkt in i blodet, men den kan även användas för blodprovstagning.

När du ska få behandling sätts en nål in i venporten. Nålen kan sitta i sju dagar täckt av ett förband. Därefter byts den eller tas bort.

Vad är en venport?

En venport är en dosa av plast med ett membran som tål att stickas i många gånger. En tunn plastslang är kopplad till dosan.

Plastslangen opereras in i ett större blodkärl på halsen eller vid axeln och leds under huden till bröstkorgen, där dosan placeras. Du kan se och känna dosan utanpå huden som en liten förhöjning. Venporten kan användas under lång tid, upp till flera år, och du kan leva som vanligt med den.



I samband med operationen får du med dig ett informationskort om venporten, vilket kan förvaras i plånboken. Detta bör du visa när du besöker vården.

Duscha inför operation

För att minska risken för infektion ska du duscha med ett bakteriedödande hudrengöringsmedel inför operationen sk. Descutan® . Detta kan du köpa på apoteket. Följ instruktionerna i förpackningen och duscha både på kvällen före och på operationsdagens morgon. Sov i rena sängkläder och ta på dig rena kläder på morgonen.

Så går operationen till

Venporten opereras in på operationsavdelningen. Området där venporten ska opereras in tvättas med hudsprit, det kan kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med operationsdukar.

Operationen genomförs oftast med lokalbedövning, eventuellt i kombination med lugnande mediciner.

Bedövningssticken kan kännas brännande under någon minut. Efter bedövningen gör det inte ont, men det är vanligt att du känner beröring. Bedövning och operation tillsammans tar oftast inte mer än en timme.

Hur mår du efteråt?

Efter operationen återgår du till din vårdavdelning/ medicinska enhet. Efter operationen får du äta och dricka som vanligt.

De första dygnet efter operationen kan det kännas ömt och vara svullet omkring såret. Det bör gå över efter några dagar och det brukar räcka att ta receptfria värktabletter.

Hur ser såret ut?

Det blir ett litet sår i huden där venporten har opererats in. Du kommer att få besked om såret sytts ihop med självupplösande stygn eller sådana som du behöver hjälp med att ta bort. Såret täcks med ett genomskinligt plastförband som du kan duscha med.

Det kan komma luftbubblor eller lite blodtillblandad vätska under förbandet. Detta är inget att oroa sig för. Förbandet kan tas bort efter 7 dagar, därefter behöver inte såret täckas.

Att ha en venport

Venporten kan användas så fort den är inlagd. När såret har läkt behövs inget förband och du kan bada, simma och basta om inte en nål är insatt i dosan. Ibland kan bilbältet skava där venporten har opererats in, i så fall kan du lägga en hopvikt handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet.

För att få ett snyggare och mindre framträdande ärr bör ärret skyddas mot solstrålar det närmaste året. Det finns UV-skyddande tejp att köpa på apoteket som du kan tejpa över ärret i samband med solexponering. Du kan med fördel sätta flera (2-3) lager på.

När du ska få behandling sätts en nål in i dosan. Nålen kan sitta i sju dagar täckt av ett förband. Därefter byts den eller tas bort. Tycker du att det är obehagligt med nålsticket kan salva sättas på för att bedöva huden.

Varje gång sjuksköterskan sätter eller tar bort ett dropp, eller tar ett blodprov, ska du ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att venporten fungerar som den ska innan den används. En venport kan sitta kvar och användas i flera år, så länge som läkaren anser att det behövs.

Att ta bort en venport

När venporten inte längre behövs skickar behandlande läkare en remiss till kärlmottagningen, där porten tas bort i lokalbedövning.

Komplikationer

Det är ovanligt med komplikationer men du ska alltid kontakta vården om du:

- blir svullen eller röd där venporten sitter
- får var eller vätskebildning runt portnålen
- får feber/ frossa av oklar genes
- får ont när venporten används
- blir svullen på halsen eller i armen, speciellt på den sidan venporten är inlagd

Om du har några frågor eller problem med venporten kan du kontakta din distriktssjuksköterska eller den vårdpersonal som handhar din venport.

Telefonrådgivningen: 1177

Vid akuta problem: 112

- Till exempel om du får svårt att andas eller får ont i bröstet

<http://www.regionorebrolan.se/>

Post 701 85 Örebro

Besök S Grev Rosengatan, Örebro, Kärll-thoraxkliniken,
mottagningen och avd 53, L-huset.